

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。

キュアナチュラルBB CLプラス

ビタミンB₂・B₆製剤 ビタミンC・L-システイン配合

特徴

第3類医薬品

- 肌あれ・にきびを改善し、疲れにも働く2つの主成分
脂質やたんぱく質の代謝を助け、体の内側から「肌細胞の生まれ変わり」を助けるビタミンB₂・B₆
- 肌あれ・にきびの改善を助ける4つの成分
 - ①コラーゲンの生成に欠かせないビタミンC
 - ②肌の代謝(ターンオーバー)を助けるL-システイン
 - ③脂質の代謝に関わるビオチン
 - ④不足すると肌あれが起こりやすくなるニコチン酸アミド
- 1日1回、1回2錠(15歳以上)、のみやすい白い錠剤です。
- シュガーレスです。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感、吐き気・嘔吐、腹痛

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
下痢
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効 能

1. 次の諸症状の緩和
 - 肌あれ、にきび・吹き出物
 - 湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ
 - 口内炎、口角炎(唇の両端の腫れ・ひび割れ)、口唇炎(唇の腫れ・ひび割れ)、舌の炎症
2. 次の場合のビタミンB₂ B₆の補給
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

「ただし、上記1の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師に相談すること。」

用法・用量

次の量を、水またはお湯で、かまずに服用すること。

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	2錠	1回
7歳~14歳	1錠	
7歳未満	服用しないこと	



<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)用法・用量を厳守すること。
- (3)1日1回、いつ服用してもかまいません。

(裏面へ続く)

成分 2錠(15歳以上の1日服用量)中

成分	含量
リボフラビン(ビタミンB ₂)	30mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	100mg
アスコルビン酸(ビタミンC)	150mg
L-システイン	60mg
ニコチン酸アミド	60mg
ビオチン	75μg


添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、セルロース、
ヒプロメロース、エリスリトール、マクロゴール、酸化チタン、アラビア
ゴム、タルク

<成分に関連する注意>

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビンによる
ものなので心配ありません。

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4)ビンの中の詰め物は、フタをあけた後はすてること(詰め物を再びビンに入れると湿気を含み品質が変わるものになる。詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するためのものである)。
- (5)服用のつどビンのフタをしっかりとしめること(吸湿し品質が変わる)。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (7)箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入すること。
- (8)一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用すること。



本製品のご注文や各種お問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

アリナミン製薬ダイレクトお客様係

通話料無料：0120-866-333

受付時間：9：00～20：00（年末・年始を除く）

なお、下記ECサイトからもご注文いただけます。

アリナミン製薬ダイレクト

検索

<https://alinamin-direct.jp/>



製造販売元 **アリナミン製薬株式会社**

〒541-0045 大阪市中央区道修町四丁目1番1号