

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。

メグリオ

婦人薬

特徴

第2類医薬品

- メグリオは、7種の生薬を配合し、ホルモンバランスの乱れなどからくる、冷え症・のぼせ・めまいに効果をあらわします。
- 1回3錠、1日3回で効果があります(15歳以上の場合)。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

下痢

4. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効能

更年期障害、血の道症^{注1)}、月経不順、冷え症およびそれらに随伴する次の諸症状：
月経痛、腰痛、頭痛、のぼせ、肩こり、めまい、動悸、息切れ、手足のしびれ、こしけ^{注2)}、血色不良、便秘、むくみ

<効能に関連する注意>

注1) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである

注2) こしけとは、おりもののことである

(裏面へ続く)

用法・用量

次の量を、食後に水またはお湯で、服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	3錠	3回
11歳～14歳	2錠	
11歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)用法・用量を厳守すること。

成分 9錠(2.7g、15歳以上の1日服用量)中に次の成分を含有する。

カンゾウ、コウブシ、ジオウ、シャクヤク、センキュウ、トウキ、ニンジンエキス … 1.5g

カンゾウ	0.95g
コウブシ	0.50g
ジオウ	0.50g
シャクヤク	0.90g
センキュウ	0.75g
トウキ	1.5g
ニンジン	0.30g

上記生薬より抽出

添加物：カルメロースCa、二酸化ケイ素、クロスカルメロースNa、セルロース、ステアリン酸Mg

<成分に関連する注意>

生薬を用いた製品なので、製品により錠剤の色調が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4)ビンの中の詰め物は、フタをあげた後はすてること(詰め物を再びビンに入れると湿気を含み品質が変わるものになる。詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するためのものである)。
- (5)服用のつどビンのフタをしっかりとめること(吸湿し品質が変わる)。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (7)箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入すること。
- (8)一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用すること。



本製品のご注文や各種お問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

アリナミン製薬ダイレクトお客様係

通話料無料：0120-866-333

受付時間：9：00～20：00（年末・年始を除く）

なお、下記ECサイトからもご注文いただけます。

アリナミン製薬ダイレクト

検索

<https://alinamin-direct.jp/>



製造販売元 **アリナミン製薬株式会社**

〒541-0045 大阪市中央区道修町四丁目1番1号