



30

第3類医薬品

VITA-AGE

ビタエージ



外箱が開いていた/中の包装が破れている等、開封された形跡がある場合は使用しないでください



押しあける

第3類医薬品

30包 (1.6g×30)

販売名：ビタエージ ビタミンEC製剤

△ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の診断を受けた人。フェニルケトン尿症
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること 便秘、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振

効 能

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻血
- 次の場合のビタミンECの補給：肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期「ただし、上記 1～3 の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師または歯科医師にご相談ください」

用法・用量

次の量を、水またはお湯で服用してください

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
15 歳以上	1 包	1～3 回
15 歳未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意> 用法・用量を厳守してください

郵簡由郵

台 異 景 稀



成 分 3包 (1.6g×3) 中

d-α-トコフェロールコハク酸エステル	300mg
ビタミンCとして アスコルビン酸 (ビタミンC) アスコルビン酸カルシウム	1,500mg 1,050mg 544.6mg
リボフラビン 酪酸エステル (ビタミンB ₂ 酪酸エステル)	12mg

添加物：エリスリトール、アスパルテーム (L-フェニルアラニン化合物)、無水ケイ酸、トウモロコシデンプン

<成分に関連する注意>

- 尿および大便の検査を受ける場合には、本剤を服用していることを医師に知らせてください (尿および大便の検査値に影響をおよぼすことがあります)
- 本剤の服用により尿が黄色くなるがありますが、リボフラビン 酪酸エステルによるもので心配ありません

保管および取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に箱に入れて保管すること
- 小児の手の届かない所に保管すること
- 本製品は添付文書が添付されておりませんので、この箱をお薬とともに保管し、服用に際して必ず読むこと
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

製造販売元 アリナミン製薬株式会社

大阪市中央区道修町四丁目1番1号

ご注文や各種お問い合わせは


通話料 0120-866-333
無料 [9:00～20:00 年末・年始を除く]

副作用被害救済制度の問合せ先 電話 0120-149-931

D1

AS-1

30包



ビタエージ VITA-AGE
A smooth granule with a sweet and sour taste that is easy to swallow.

1500mg
Vitamin C

300mg
Vitamin E

12mg
Vitamin B₂

1回1包・1日1～3回 (15歳以上)

第3類医薬品

抗酸化成分配合

末梢血行障害による

肩・首すじのこりや手足の冷えに効く。

しみ・そばかすに効く。

肉体疲労時などのビタミンEC補給に。

ビタミンC

●ビタミンCは皮膚や粘膜の正常な働きを助けるとともに抗酸化作用があります。

ビタミンE

●ビタミンEは抗酸化作用により体内の脂質を酸化から守り、細胞の正常な働きを助けます。

ビタミンB₂

●ビタミンB₂は皮膚・粘膜の正常な働きを助けます。

1